

	Hiver Jan – Fév - Mar	Printemps Avr – Mai - Juin	Eté Juil – Aoû - Sep	Automne Oct – Nov - Déc
1. Entretien				
– Tonte une fois par semaine (Hauteur de tonte : 1,0 à 1,5 cm)		• • •	• • •	
– Tonte deux fois par mois (Hauteur de tonte : 1,0 à 1,5 cm)	• • •			• • •
– Scarification, aération, sablage, et terreautage une fois par an		•		
2. Arrosage				
– Arrosage chaque jour (5 mm par jour d'arrosage)			• • •	
– Arrosage un jour sur deux (5 mm par jour d'arrosage)		• • •		
– Arrosage deux fois par semaine (5 mm par jour d'arrosage)	• • •			• • •
3. Fertilisation				
– Engrais NPK complet 15-15-15 ou 14-28-14 à la dose de 50 g / m ²	•			
– Engrais azoté rapide (Ammonitrate 33,5 %) à la dose de 25 g / m ²		•	•	
– Engrais potassique (Sulfate de potasse 48/50 % de K ₂ O) à la dose de 25 g / m ²		•		
– Engrais azoté lent (Sulfate d'ammoniaque 21 %) la dose de 25 g / m ²				•
– Engrais organique (Ferticompost) à la dose de 500 g / m ²		•		•
4. Traitement phytosanitaire				
– Contre les mauvaises herbes : Utiliser Dialen Super* à la dose de 1l / ha par pulvérisation le soir (Pas de pluie ou d'arrosage au moins 6 heures après le traitement)				
– Contre le vert gris (Noctuelle potagère) : Utiliser Chlorpyrifos Éthyle** à la dose de 4l / ha par pulvérisation le soir				
– Traitement préventif contre les maladies fongiques : Aucun si on respecte la présente fiche d'entretien et notamment***				
– En cas d'apparition d'une maladie fongique**** procéder à un traitement curatif en utilisant un fongicide (Matière active : Azoxystrobine + Cyproconazole)				

* Ou autre herbicide systémique contre les dicotylédones

** Ou autre insecticide à large spectre contre les ravageurs

*** Respecter i) le programme de fertilisation, ii) les fréquences d'arrosage, iii) la tonte régulière, iv) l'évacuation régulière des matières mortes

**** Les principales maladies fongiques : Fil rouge, rouille, fusariose, pourriture à phythium, oïdium, dollar-spot